

Jeśli Twoje dziecko wykazuje przynajmniej 4 z poniższych objawów, warto wykonać diagnostykę w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD traktujemy jako zespół objawów powstałych w wyniku uszkodzenia i/lub zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego oraz procesów wstępujących i zstępujących, warunkujących prawidłowe słyszenie.

Brytyjskie Towarzystwo Audiologiczne, 2018

KLASYFIKACJA		OBJAWY	TAK	NIE
Zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie		Trudności w rozumieniu mowy w hałasie		
		Trudności w rozumieniu mowy w grupie (w sytuacji 1:1 dziecko nie wykazuje najczęściej trudności w rozumieniu mowy).		
		Zaburzenia koncentracji uwagi, częste rozpraszanie		
		Szybka męczliwość, zwłaszcza przy wykonywaniu zadań złożonych		
		Trudności w lokalizacji źródła dźwięku		
		W próbie powtarzania długich zdań, brak zrozumiałości sensu		
		Trudności w zapamiętywaniu tekstów, zdań, pytań prezentowanych na drodze słuchowej		
		Trudności w zapamiętywaniu imion, nazw własnych, dni tygodnia, miesięcy, pór roku, tj. zaburzona słuchowa pamięć słowna		
		Brak rozumienia opowiadań, bajek prezentowanych na drodze słuchowej (bez wsparcia wzorkowego, tj. obrazków, ilustracji, zdjęć)		
		Trudności emocjonalne (impulsywność, rozdrażnienie, wrażliwość emocjonalna, niskie poczucie własnej wartości, trudności w radzeniu sobie z porażką, wycofanie, nieśmiałość, agresywność, płaczliwość)		
Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym		Trudności w zakresie słuchu fonematycznego (nieprawidłowe różnicowanie głosek podobnie brzmiących, zamiana głosek dźwięczna – bezdźwięczna, trudności w różnicowaniu dźwięków wysoki- niski, melodii, rytmów)		
		Trudności w nauce czytania		
		Trudności w poprawnym pisaniu, w tym głównie pisaniu ze słuchu		
		Wada wymowy (m.in. dyslalia słuchowa)		
		Stwierdzona dysleksja lub ryzyko dysleksji		
Zaburzenia integracji słuchowo-wzrokowej		Zaburzenia prozodii mowy (akcent, intonacja, iloczasy)		
		Opóźniony rozwój mowy ORM		
		Trudności z rozwiązywaniem trudniejszych, złożonych czynności		
		Trudności z rozumieniem emocji innych osób		
		Niezdarność ruchowa lub zaburzenia integracji sensorycznej SI		
Historia laryngologiczna dziecka – czynnik ryzyka dla APD		Skrzyżowana lateralizacja		
		Zapalenia uszu w przeszłości		
		Przebyty drenaż / drenaże uszu		
		Usunięcie III migdałka gardłowego (adenotomia)		
		Nadwrażliwość słuchowa		
		Napady drgawkowe		
		Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych		
		Wcześnieactwo		
		Niedotlenienie w czasie porodu		